

## Kenmerkende ziektebeelden van bacterievuur

Afhankelijk van de periode in het groeiseizoen zijn duidelijke symptomen zichtbaar.



Als eerste: verwelkte bloesems (terwijl de bloei nog niet ten einde lijkt).

Bron: provincie West-Vlaanderen (fotograaf Tom Deckers)



In een verder stadium: bruin-, zwartverkleuring van de bloesems, vruchten, bladeren en twijgen (als door 'vuur' verschroeid).

Bron: provincie West-Vlaanderen (fotograaf Tom Deckers)




Jonge, aangetaste scheuten krullen helemaal om. Deze worden vaantjes, vlaggetjes of bisschopsstaf genoemd.

Bron: provincie West-Vlaanderen (fotograaf Frans Goossens)



Bron: provincie West-Vlaanderen (fotograaf Tom Deckers)

Bloem, bladstelen en groene scheuten vertonen op sommige plaatsen slijmachtige afscheidingen (eerst wit, later oranje-bruin).



Bron: provincie West-Vlaanderen (fotograaf Frans Goossens)

Tijdens de winter vallen aangetaste bloemen, bladeren en vruchten niet van de plant.

Ook typisch: bij het aansnijden van de schors van de takken is er een oranjeachtige verkleuring onder de bast.